МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ масштаба 1 : 200 000

Издание второе

Тиманская серия

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА И КАРТА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ДОНЕОГЕНОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

P-40-XX (Тимшер)

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ И МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

Система | Отдел | Ярус | Горизонт | Индекс | Колонка | Мощность, м | Характеристика подразделений

МЕЗЕНСКО-ВЫЧЕГОДСКАЯ СФЗ
Джежимпармско-Кельтменский район

P_2uk — более 114
Устькуломская свита. В нижней части глины коричневые, серые с прослоями известняков. Выше – глины красноцветные, песчаники, линзы гравелитов

$P_2žž$ — 50
Жежимская свита. Известняки мелкообломочные, оолитовые с линзами кремней. В нижней части пласт темно-серого пелитоморфного известняка. Прослои глин и песчаников

P_2kd — 80
Кидровская свита. Глины серощветные и красноцветные с прослоями известняков, песчаников и алевролитов

P_2sn — 60
Синдорская свита. Серощветные глины с прослоями песчаников, алевролитов, реже – доломитов и известняков. В нижней части разреза доломиты и известняки глинистые с прослоями глин. *Durvisula sp.*

ТИМАНО-КЕЛЬТМЕНСКАЯ СФЗ
Среднетиманско-Кельтменский район

P_2ir — 82
Иренская свита. Переслаивание гипсов и доломитов. В верхней части пласт глинисто-гипсовой породы

P_2fl — более 60
Филипповская свита. Известняки оолитовые, пелециподовые, доломиты. Прослои известковых мергелей. *Aiburia semicostata* Waag., *Siphonodonta* Schl., *Neophricodothyris asiatica* Chao, *Sanguinolites lunulatus* Keys., *Stutchburia tscheyschevi* Lich.,*Pseudomonotis radialis* Phill., *Bakewellia ceratophaguoformis* Nein. **Месторождения известняка**

P_2lb — 50–150
Тыбьюская свита. Известняки, доломиты метасоматические органогенные и детритовые с линзами, конкрециями кремней. На востоке площади в верхней части разреза – глинистые известняки и глины с гипсом, ангидритом. *Megousia augardi* (Toula), *Sowerbina timanica* (Stuck.), *Chonetes* (*Chonetina*) *timana* Krot., *Neophricodothyris asiatica* Chao, *Nodosaria netschajevi ronda* Lip., *Schubertella sphaerica* Sul.

C_3–P_1ar-*sm* — 210–215
Буркемская, одесская, айвовинская толщи верхнего карбона, южноуральская и северомытвинская свиты нижней перми нерасчленённые. Доломиты, известняки доломитизированные с реликтовой органогенной структурой, прослоями органогенно-обломочные, часто перекристаллизованные; редкие пласты мергелей, линзы и конкреции кремня. *Pseudofusulina ex. gr. uralica* Krot., *P. paradoxa* Shamov et Serbovich, *Pseudochusenella lutuginiformis* (Raus.), *Dunbarinella ex. gr. gregaria* (Lee), *Nodosaria netschajevi* Teherd. **Проявления поделочных камней**

C_2kd_2 — 135–145
Верхняя подсвита. В основании разреза (30 м) пачка глинистых доломитизированных известняков. Выше известняки доломитизированные до доломитов перекристаллизованные и органогенно-детритовые с гипсом, участками слабо окремнены. *Spirifer gerassimowi* Stepanov., *Parastaffella* sp.

C_2kd_1 — 80–100
Нижняя подсвита. Переслаивание известняков и глин, известняки органогенно-детритовые, часто глинистые и алевритовые, глины известковые, прослои песчаника. *Chonetes tcehvi* A. et E. Ivan., *Dictyoclostus moelleri* Stuck., *Orthotetes regularis* Waag., *Schubertella obscura* Lee et Chen, *Eostaffella acuta* Grozd. et Leb., *Pseudostaffella paracompressa* Saf.

C_2el — 22–53
Елмачская свита. Известняки доломитизированные, доломиты часто с криноидеями, брахиоподами, с кремнями, гипсом и ангидритом. *Chonetes carbonifera* Keys., *Eostaffella cf. pseudostruvei* var. *angusta* Kir., *Profusulinella* cf. *staffelloformis* Kir.

C_1lm — 115
Лунывльская свита. Доломиты, доломитизированные известняки с небольшой примесью глинистого материала

Средне-Южнотиманский район

C_1m — 51
Тимшерская свита. Глины, мергели темно-серые, пестроокрашенные, доломиты, алевролиты-песчаники. *Scrobicula asymmetrica* Kotsch., *Cribroconcho* cf. *hicrmigera* var. *elonga* Sun. et Sm., *Earlandia elegans* (Raus. et Reitl.), *Archaediscus krestovnikovi pusilla* Raus. и др., бобриковский и тульский споково-пыльцевые спектры

ТИМАНО-ПЕЧОРСКАЯ СФЗ
Вуктыло-Джебольский район

D_3vs — 212
Восточносавинворбская толща. Доломиты известковые, известняки неравномерно доломитизированные, серые, пятнистоокрашенные, перекристаллизованные, редко окремнённые. *Parathurammina diagnostae* var. *aldae* Sul., *Archaesphaera minima* Sul., *Radiosphaera ponderosa* Reitl., *Chlyenilla devonica* Reitl.

$D_3jš$ — 130
Ижемская свита. Известняки серые, светло-серые, в нижней части глинистые с тонкими прослоями глин. Выше – доломитизированные, прослоями глинистые. *Leiorhynchus rotundus* Net., *L. ex. gr. quadricostata* Vanux., *Microchenella keyserling* Mart., *Acratia zadonica* Eg., *Bartdia elegiana* Eg., *Famenella incondita* Pol., *Paratharammina bella* Reitl.

Доманиковая, мендымская свиты и битуминозно-глинисто-известняковая толща объединенные.
Битуминозно-глинисто-известняковая толща. Известняки, глины. В основании брекчия. *Leiorhynchus rotundus* Net., *L. megistanus* Le Hon, *Parapurchites rosilerus* Mart. Мощность 22 м.
Мендымская свита. Переслаивание битуминозных, окремненных известняков и черных глинистых сланцев. *Entomozoe* (*Richteria*) *timanica* Mart., *E. (R.) sarateiensis* Pol., *Leiorhynchus bipliciato* Nal., *Lingula ex. gr. subparallela* Sand. Мощность 22 м.
Доманиковая свита. Известняки темно-серые глинистые, окремненные. *Entomozoe* (*Nehdentomis*) *cf. accurata* Pol., *E. (N) cf. triangula* Pol., *E. (N.) aff. spiralis* Mart. Мощность 13 м

D_3dm-bg — 54

D_3tm-up — 56
Тиманская и устьрегосая свиты объединенные.
Устьрегосая свита. Глины темно-серые, часто с растительными остатками. Прослои известняков серых, глинистых. *Camarotechia golinae* Ljasch., *Ladogia meyendorfi* (Vern.), *Lamellisporiter novosibricus* Tall., *Elytha orbiculata* Com. Мощность 37 м.
Тиманская свита. Глины серые с прослоями известняков, песчаников. В основании – конгломераты. *Cyrtospirifer marchioninianus* Vern., *Schizophoria* ex. *gr. striatula* Schl. Мощность 19 м

КАНИНО-ТИМАНСКО-ИЖЕМСКАЯ ЗОНА
Восточнотиманская подзона

$RF_3pš^2$ — более 56
Пижемская свита. Сланцы метаморфические темно-серые, зеленовато- и коричнево-серые, хлорит-биотитовые (?), хлорит-серицитовые

ПЕЧОРО-МЫЛВИНСКАЯ СФЗ
Ижма-Мылвинский район

P_2ir — более 217
Иренская свита. Переслаивание пачек (мощностью 25–60 м) ангидритов с включениями глин, прослоями доломитов и пачек (мощностью 5–10 м) доломитов глинистых с гнездами ангидрита и гипса, с прослоями оолитовых известняков

P_2fl — 54–72
Филипповская свита. Пачки ангидритов, доломитов и известняков. Ангидриты голубовато-белые с включениями темно-серых глин, с прослоями доломитов. Мощность до 40 м. Доломиты. известняки доломитизированные глинистые с гнездами гипса. Мощность до 30 м. *Tetrataxinna fraudolenta* Lip.

P_1lb — 50–150
Тыбьюская свита. Известняки, доломиты метасоматические органогенные и детритовые с линзами, конкрециями кремней. На востоке площади в верхней части разреза – глинистые известняки и глины с гипсом, ангидритом. *Megousia augardi* (Toula), *Sowerbina timanica* (Stuck.), *Chonetes* (*Chonetina*) *timana* Krot., *Neophricodothyris asiatica* Chao, *Nodosaria netschajevi ronda* Lip., *Schubertella sphaerica* Sul.

C_1–P_1ar-*sm* — 210–215
Буркемская, одесская, айвовинская толщи верхнего карбона, южноуральская и северомытвинская свиты нижней перми нерасчленённые. Доломиты, известняки доломитизированные с реликтовой органогенной структурой, прослоями органогенно-обломочные, часто перекристаллизованные; редкие пласты мергелей, линзы и конкреции кремня. *Pseudofusulina ex. gr. uralica* Krot., *P. paradoxa* Shamov et Serbovich, *Pseudochusenella lutuginiformis* (Raus.), *Dunbarinella ex. gr. gregaria* (Lee), *Nodosaria netschajevi* Teherd.

C_2kd_2 — 135–145
Верхняя подсвита. В основании разреза (30 м) пачка глинистых доломитизированных известняков. Выше известняки доломитизированные до доломитов перекристаллизованные и органогенные с гипсом, участками слабо окремнены. *Spirifer gerassimowi* Stepanov., *Parastaffella* sp.

C_2kd_1 — 80–100
Нижняя подсвита. Переслаивание известняков и глин, известняки органогенно-детритовые, часто глинистые и алевритовые, глины известковые, прослои песчаника. *Chonetes tcehvi* A. et E. Ivan., *Dictyoclostus moelleri* Stuck., *Orthotetes regularis* Waag., *Schubertella obscura* Lee et Chen, *Eostaffella acuta* Grozd. et Leb., *Pseudostaffella paracompressa* Saf.

C_2el — 22–53
Елмачская свита. Известняки доломитизированные, доломиты часто с криноидеями, брахиоподами с кремнями, гипсом и ангидритом. *Chonetes carbonifera* Keys., *Eostaffella cf. pseudostruvei* var. *angusta* Kir., *Profusulinella* cf. *staffelloformis* Kir.

C_1c — 115
Карбонатная толща. Доломиты, прослои доломитизированных известняков. Гнезда гипса, ангидрита. По всей толще слабое окремнение

C_1t — 51
Терригенная толща. В нижней части глины темно-серые тонкослюдистые, алевритистые с прослоями песчаников и алевролитов. В верхней части глины коричневато-, красновато-бурые с прослоями песчаников и известняков. *Archaediscus moelleri* Raus., *Endothyra prisca* Raus. et Reitl., *Chonetes zimmermani* Paeck. и др.


P-40-XIV
P-40-XXV
P-40-XXVI
1
2
3
4
A1
A2
A3
55° 00'
55° 15'
55° 30'
55° 45'
56° 00'
61° 00'
61° 40'
61° 50'
61° 30'
60° 20'
60° 00'
55° 00'
I
II
III
IV
Тимшер
Ухта-Ижемский вал
Боровой мегавал
Немская ступень
Кельтменско-Удорская зона дислокаций
Джежим-Ксенофонтовский мегавал
Восточно-Тиманский мегавал
Мылвинская депрессия
Ксенофонтовский вал
Выдывожская антиклиналь
Заукъянская антиклиналь
Ижма
Печора
Усть-Цильма
Нерица
Ухта
Сосногорск
Вуктыл
Усинск
Инта
Воркута
Сыктывкар
Ухтарка
Ярега
Ярегское
Ярегское-Восточное
Ярегское-Северное
Ярегское-Западное
Ярегское-Южное
Ярегское-Юго-Западное
Ярегское-Центральное
Ярегское-Северо-Восточное
Ярегское-Северо-Западное
Ярегское-Юго-Восточ