МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ГЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА ГЕОЛОГІЧНА КАРТА УКРАЇНИ

Масштаб 1 : 200 000

ГЕОЛОГІЧНА КАРТА І КАРТА КОРИСНИХ КОПАЛИН ЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ

Центральноукраїнська серія

М-36-XXXIII (Кіровоград)

2005 р. — 2007 р.

ГЕОМОРФОЛОГІЧНА СХЕМА



1: 500 000
в 1 сантиметрі 5 кілометрів
км 5 0 5 10 15 км

ГЕОМОРФОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

Країна:	**Східно-Європейська полігення рівнина**	**В**
Область:	**Придніпровсько-Приазовських пластово-денудаційних цокольних височин та низовин. Лесова область УЩ**	**В-II**
Підобласть:	Центрально-Придніпровська денудаційна рівнина на неогенових, палеогенових відкладах та докембрійських породах	
	Центральноукраїнська акумулятивно-платформна морфоструктура I рангу	**В-II-13**
Район:	Кіровоградська акумулятивно-денудаційна хвиляста слабороздренована низовинна рівнина	
	Кіровоградська морфоструктура II рангу	**В-II-13-в**
Підрайон:	Інгуло-Інгулецький Морфоструктура III рангу з легко- та середньосуглинистим покровом	**В-II-13-в₁**
Ділянка 1:	Цокольна акумулятивно-денудаційна рівнина переважно на міоценових відкладах та докембрійських породах	**В-II-13-в₁-А**
Ділянка 2:	Цокольна акумулятивно-денудаційна рівнина переважно на докембрійських породах та відкладах міоцену і пліоцену	**В-II-13-в₁-Б**

Межі структурно-геоморфологічних ділянок

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

ГЕНЕТИЧНІ ТИПИ РЕЛЬЄФУ

Акумулятивно-денудаційний

Акумулятивно-денудаційна (лесова) рівнина (вік N_2-H) сформована переважно на:

- докембрійських породах
- докембрійських породах та міоценових відкладах
- докембрійських породах та пліоценових відкладах

Пологі схили акумулятивно-денудаційної (лесової) рівнини, сформовані в результаті площинного змиву в умовах розвитку пухких четвертинних відкладів (dP_I-H)

Флювіальний

Надзаплавні тераси ($f^{a}P_{III}$tb, $f^{a-a}P_{III}$vl-tb, $f^{a}P_{III}$vl, $f^{a-a}P_{III}$ds-vl, $f^{a}P_{III}$ds)

Заплава

Вік голоценовий (H)

Еоплейстоцен-нижньоеоплейстоценова похована тераса. Алювіальні відклади. Еоплейстоцен-нижньоеоплейстоценовий вік ($\mathcal{E}$-P_I)

Денудаційно-ерозійний

Схили річкових долин та ярів (dnP_{I-III}-H)

ФОРМИ РЕЛЬЄФУ

Акумулятивні

- Конуси виносу. Вік голоценовий (H)
- Степові блюдця. Вік голоценовий (H)

Ерозійні

- Русла тимчасових водотоків. Вік голоценовий (H)
- Зсуви. Вік голоценовий (H)

Денудаційні

- Рельєф, пов'язаний з препаруванням виходів кристалічних порід

ІНШІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- Границі: геоморфологічних елементів достовірні (1); між водоподільною рівниною та її схилами, ймовірні (2); між осадовими дочетвертинними відкладами та кристалічними породами, на яких сформована сучасна вододільна рівнина, ймовірні (3)
- Тилові уступи: III надзаплавної тераси (1); II-III надзаплавної тераси (2); II надзаплавної тераси (3); I-II надзаплавної тераси (4); I надзаплавної тераси (5). Ерозійні уступи, сформовані при врізанні річок у пухкі четвертинні відклади в середньо-верхньоеоплейстоценовий час (6)
- Лінеаменти, що ідентифікуються як розривні порушення за зміною: конфігурації річкової мережі та МАКЗ (1); терасового рельєфу та МАКЗ (2)
- Ймовірні неотектонічні порушення, виділені за морфометричними та геоморфологічними даними
- Локальна неотектонічна позитивна кільцева морфоструктура, виділена за зміною конфігурації річкової мережі та МАКЗ
- Геоморфологічні пам'ятки, рекомендовані до затвердження

ЛЕГЕНДА ДО КАРТИ ЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ

ГОЛОЦЕН

aH — Алювіальні відклади заплав та балок. Піски кварцові різнозернисті до тонкозернистих, супіски (до 5,0 м)

tH — Техногенні відклади (до 5,0 м)

abH — Алювіально-болотяні відклади. Мул, суглинок з прошарками пісків (до 1,5 м)

adP$_{III}$-H — Алювіально-делювіальні відклади заплав та балок. Суглинки середні, легкі, супіски, піски кварцові глинисті (до 7,5 м)

dP$_{III}$-H — Делювіальні відклади. Суглинки середні, супіски, піски (до 6,0 м)

ВЕРХНІЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕН – ГОЛОЦЕН

ВЕРХНЯ ЛАНКА

eP$_{III}$ — Елювіальні відклади. Виходні грунти, суглинки легкі, середні (до 3,5 м)

dvP$_{III}$ — Делювіально-еолові відклади. Суглинки лесовидні, легкі до супісків (до 4,0 м)

e,vdP$_{III}$ — Елювіальні та еолово-делювіальні відклади. Виходні суглинисті грунти, середні, легкі, з прошарками легких лесовидних суглинків (до 8,0 м)

ed,vdP$_{III}$ — Елювіально-делювіальні та еолово-делювіальні відклади. Виходні суглинисті грунти середні, легкі, з прошарками легких лесовидних суглинків (до 7,5 м)

vdP$_{III}$pC — Причорноморський кліматоліт. Еолово-делювіальні відклади. Суглинки лесовидні, легкі (до 1,5 м)

eP$_{III}$df — Дофінівський кліматоліт. Елювіальні відклади. Виходні грунти. Суглинки легкі, середні (до 1,2 м)

a^{a}P$_{III}$ds — Деснянський ступінь. Алювіальні відклади першої надзаплавної тераси. Піски кварцові, дрібнозернисті до грубозернистих, з прошарками суглинків (до 14,0 м)

vdP$_{III}$bg — Бузький кліматоліт. Еолово-делювіальні відклади. Суглинки лесовидні, легкі (до 6,0 м)

eP$_{III}$vt — Витачівський кліматоліт. Елювіальні відклади. Виходні грунти, суглинки середні (до 3,0 м)

a^{a}P$_{III}$vl-ds — Вільшанський і деснянський ступені. Алювіальні відклади другої та першої нерозчленованих надзаплавних терас. Піски різнозернисті з прошарками суглинків (до 5,0 м)

a^{a}P$_{III}$vl — Вільшанський ступінь. Алювіальні відклади другої надзаплавної тераси. Піски пильовошпат-кварцові, різнозернисті до крупно- і грубозернистих, з прошарками суглинків (до 10,0 м). *Виїмчують родовища піску будівельного*

a^{a-a}P$_{III}$tb-vl — Трубізький і вільшанський ступені. Алювіальні відклади третьої і другої надзаплавних нерозчленованих терас. Піски кварцові, серпево-дрібнозернисті, гравійні, глинисті з прошарками суглинків (до 4,0 м)

eP$_{III}$pl-vt — Прилуцький і витачівський кліматоліти. Елювіальні відклади. Виходні грунти, суглинки середні (до 4,0 м)

vdP$_{III}$ud — Удайський кліматоліт. Еолово-делювіальні відклади. Суглинки лесовидні, середні (до 2,0 м)

a^{a}P$_{III}$tb — Трубізький ступінь. Алювіальні відклади третьої надзаплавної тераси. Піски кварцові, різнозернисті, з прошарками суглинків і супісків (до 8,5 м)

eP$_{III}$pl — Прилуцький кліматоліт. Елювіальні відклади. Виходні грунти, суглинки середні (до 3,0 м)

СЕРЕДНЯ – ВЕРХНЯ ЛАНКИ

adP$_{III-III}$ — Елювіально-делювіальні відклади. Виходні грунти, суглинки середні (до 5,0 м)

ed,vdP$_{III-III}$ — Елювіально-делювіальні та еолово-делювіальні відклади. Виходні суглинисті грунти середні, з прошарками лесовидних суглинків (до 11,0 м)

СЕРЕДНЯ ЛАНКА

eP$_{II}$ — Елювіальні відклади. Виходні грунти, суглинки важкі, середні (до 3,0 м)

e,vdP$_{II}$ — Елювіальні та еолово-делювіальні відклади. Виходні суглинисті грунти з прошарками лесовидних суглинків (до 7,0 м)

eP$_{II}$kd — Кайдацький кліматоліт. Елювіальні відклади. Виходні грунти, суглинки середні (до 1,5 м)

vdP$_{II}$dn — Дніпровський кліматоліт. Еолово-делювіальні відклади. Суглинки лесовидні легкі, середні (до 9,0 м) *Виїмчують родовища цегельно-черепичної сировини*

eP$_{II}$zv — Завадівський кліматоліт. Елювіальні відклади. Виходні грунти, суглинки середні, важкі (до 5,0 м)

НИЖНЯ-СЕРЕДНЯ ЛАНКИ

e,vdP$_{I-II}$ — Елювіальні та еолово-делювіальні відклади. Виходні суглинисті грунти з прошарками лесовидних суглинків (до 10,0 м)

ed,vdP$_{I-II}$ — Елювіально-делювіальні та еолово-делювіальні відклади. Виходні суглинисті грунти, важкі, середні з прошарками лесовидних суглинків (до 6,0 м). *Виїмчують родовища цегельно-черепичної сировини*

dP$_{I-II}$lb-zv — Лубенський та завадівський кліматоліти. Елювіальні відклади. Виходні грунти, суглинки важкі (до 5,5 м)

НИЖНЯ ЛАНКА

eP$_{I}$ — Елювіальні відклади. Виходні грунти, суглинки важкі (до 15,0 м)

e,vdP$_{I}$ — Елювіальні та еолово-делювіальні відклади. Виходні суглинисті грунти, важкі з прошарками лесовидних суглинків (до 8,0 м)

vdP$_{I}$tl — Тилігульський кліматоліт. Еолово-делювіальні відклади. Суглинки лесовидні легкі, середні (до 2,0 м)

eP$_{I}$lb — Лубенський кліматоліт. Елювіальні відклади. Виходні грунти, суглинки важкі (до 5,0 м)

vdP$_{I}$sl — Сульський кліматоліт. Еолово-делювіальні відклади. Суглинки лесовидні середні (до 2,0 м)

eP$_{I}$mr — Мартоноський кліматоліт. Елювіальні відклади. Виходні грунти, суглинки важкі (до 5,0 м)

sP$_{I}$sh-mr — Широкинський та мартоноський кліматоліти. Елювіальні відклади. Виходні грунти, суглинки важкі (до 7,0 м)

eP$_{I}$sh — Широкинський кліматоліт. Елювіальні відклади. Виходні грунти, суглинки важкі (до 7,0 м)

edE-P$_I$ — Елювіально-делювіальні відклади. Виходні грунти, суглинки важкі, глини (до 10,0 м)

ЕОПЛЕЙСТОЦЕН – НИЖНІЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕН

ВЕРХНЯ ЛАНКА

aE$_{II}$il — Алювіальні відклади еоплейстоцен-нижньоеоплейстоценової похованої тераси. Супіски, піски різнозернисті, дрібнозернисті, з прошарками глин (до 10,0 м)

vdE$_{II}$il — Іллічівський кліматоліт. Еолово-делювіальні відклади. Глини лесовидні легкі (до 1,5 м)

eE$_{I-II}$kr — Крижанівський кліматоліт. Елювіальні відклади. Виходні грунти, глини важкі (до 3,0 м)

НИЖНЯ-ВЕРХНЯ ЛАНКИ

e,vdE$_{I-II}$ — Елювіальні та еолово-делювіальні відклади. Виходні грунти. Глини важкі, з прошарками лесовидної глини (до 5,0 м)

Дочетвертинні утворення

(*) Тільки до розрізів

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ АРКУШІВ ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОЇ СЕРІЇ

СХЕМА ВИКОРИСТАНИХ МАТЕРІАЛІВ

ГЗ 1: 200 000 – І. М. Пігулевський, 1960 р.
ГЗМК 1 : 200 000 – О. П. Стороженко, 1997 р.
ГДП 1 : 200 000 – О. М. Нечваєва, 2005 р.

ГГК 1 :200 000:
Ф. П. Бронницький, 1986 р.
О. К. Бабкіна, 1989 р.
І. М. Лінецький, 1995 р.

ГЗ 1: 50 000:
Н. Г. Зелебовська, 1966 р.
Г. М. Харков, 1968 р.
І. М. Пігулевський, 1969 р.
М. Ф. Підгайний, 1969 р.
В. В. Бабаєв, 1970 р.
Ф. В. Трушель, 1971 р.
С. Ю. Федосєєв, 1971 р.
В. П. Бунтовський, 1973 р.

СХЕМА РАЙОНУВАННЯ ЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ



Межі підрайонів, які відрізняються між собою будовою четвертинних відкладів

В-II-13-в₁ — Північноінгулецький підрайон

В-II-13-в₂ — Південноінгулецький підрайон

ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ ПО ЛІНІЇ A_1 - A_5

Масштаби: горизонтальний 1 : 200 000
вертикальний 1 : 2000

В-II-12-в₁



ТИПОВІ ЛІТОЛОГО-СТРАТИГРАФІЧНІ КОЛОНКИ ЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ



СХЕМА БУДОВИ ЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ



СХЕМА КОРЕЛЯЦІЇ ЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ

Міжнародна стратиграфічна шкала четвертинної системи		Регіональні та місцеві стратиграфічні підрозділи четвертинних відкладів			Генетичні типи відкладів								
					Прості			Складні					
Система	Відділ	Розділ	Ланка	Ступінь	Кліматоліт	Алювіальний	Техногенний	Елювіальний	Делювіальний	Алювіально-болотяний	Алювіально-делювіальний	Еолово-делювіальний	Елювіально-делювіальний	Елювіально-делювіальний та еолово-делювіальний
						a	t	e	d	ab	ad	ed	vd	e,vd	ed,vd
Q	ГОЛОЦЕН – H					aH	tH	eH		abH	adH				
ЧЕТВЕРТИННА	ПЛЕЙСТОЦЕН-ГОЛОЦЕНОВИЙ	ВЕРХНІЙ	ВЕРХНЯ P_{III}	Деснянський ds	Причорноморський	pc									
					Дофінівський	df									
				Вільшанський vl	Бузький	bg									
					Витачівський	vt									
				Трубізький tb	Удайський	ud									
					Прилуцький	pl									
		СЕРЕДНІЙ	СЕРЕДНЯ P_{II}	Черкаський čr	Тясминський	ts									
					Кайдацький	kd									
				Хаджибейський hb	Дніпровський	dn									
					Завадівський	zv									
			НИЖНЯ P_I	Кременчуцький kn	Тилігульський	tl									
					Лубенський	lb									
				Донецький dc	Сульський	sl									
					Мартоноський	mr									
				Бузький bk	Призовський	pr									
					Широкинський	sh									
	НИЖНІЙ	ЕОПЛЕЙСТОЦЕН, НИЖНІЙ ЕОПЛЕЙСТОЦЕН, ВЕРХНЯ E_{II}		Іллічівський	il										
				Нечаївський ng	Крижанівський	kr									
				Кіровоградський kž	Березанський	br									

Дочетвертинні утворення

(*) тільки на схемі будови, геологічному та літолого-стратиграфічних розрізах

ЛІТОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ВІДКЛАДІВ



(1)піски різнозернисті (1), дрібнозернисті (2); суглинки: легкі (3), легкі лесовидні (4), середні (5), середні лесовидні (6), важкі (7); мул (8); породи техногенного походження (9)
Тільки на схемі будови, геологічному розрізі та колонках: Сучасний грунт (10), щебінь (11), гравій (12), піски глинисті (13), супіски (14), глини (15), глини з прошарками пісків (16)

ЗНАКИ РІЗНОГО ЗМІСТУ

Алювіальні відклади, поховані під субаеральними утвореннями:

- друга-перша надзаплавна тераса вільшансько-деснянського ступенів
- друга надзаплавна тераса вільшанського ступеня
- третя-друга надзаплавна тераса трубізько-вільшанського ступенів
- третя надзаплавна тераса трубізького ступеня

Границі стратиграфо-генетичних підрозділів: достовірні (1), ймовірні (2)
Границя розповсюдження похованої еоплейстоцен-раннеоплейстоценової тераси (3). Межі підрайонів, які відрізняються між собою будовою четвертинних відкладів (4)

Ймовірні неотектонічні порушення, виділені за морфометричними та геоморфологічними даними (1). Лінеаменти, що ідентифікуються як розривні порушення за зміною: конфігурації річкової мережі та МАКЗ (2); терасового комплексу та МАКЗ (3)
Локальна неотектонічна позитивна кільцева морфоструктура, виділена за зміною конфігурації річкової мережі та МАКЗ (4)

Геоморфологічні позначення



Активні яри (1), лощина балок позамасштабні – adP$_{III}$-H (2); суфозійні просадкові западини (3). Гравітаційні: осипні, обвальні конуси (4), зсуви (5). Техногенні: кар'єри (6) та відвали (7) виражені в масштабі карти
Уступи: терас (8), ерозійні (9)

Відслонення та їхні номери: типові (1), типові-ключові (2)
Пункти спостережень та їхні номери. Цифри ліворуч – потужність четвертинних відкладів (у м)
Місця знахідок викопних решток: прісноводних молюсків (1), спор та пилку (2)

Бурові свердловини та їхні номери на карті. Цифри ліворуч – потужність четвертинних відкладів (у м)
Бурові свердловини на розрізах, їхні номери та глибини

A_1 — A_5 Лінія геологічного розрізу

ЛІТОЛОГО-СТРАТИГРАФІЧНА КОЛОНКА

В-II-13-в₁ – індекс району

Свр.11252 / 98,0 – номер відслонення (свердловини) / абсолютна відмітка устя свердловини (відслонення)

eP$_I$mr – стратиграфічний індекс відкладів

Цифри ліворуч від колонки – глибина залягання відкладів

КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Група	Підгрупа	Призначення	Вид корисної копалини	Родовища	Генетичні типи
НЕМЕТАЛІЧНІ	Сировина будівельна	Сировина скляних матеріалів (гравій)	Пісок будівельний	нг	Осадовий
		Сировина керамічних матеріалів	Суглинок	нч	Осадовий

ОФОРМЛЕННЯ ЗНАКУ РОДОВИЩА

64 нч
- номер за списком
- сфера застосування
- позначення неметалічної корисної копалини

ПРОМИСЛОВА ОСВОЄНІСТЬ РОДОВИЩ

- Розробляються
- Знаходяться на стадії розвідки
- Не розробляються

Карта створена в ДП "Центрукргеологія" НАК "Надра України" за замовленням Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

Автори: І. М. Нікітенко, І. І. Васильєв

Редактор З. М. Дорожевська

Карта затверджена Науково-редакційною радою Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 26.10.2006 р. (Протокол № 173)
Експерт НРР В. М. Клочков

Карта оформлена та видрукувана Північним державним регіональним геологічним підприємством "Північгеологія"

Редактори оформлення: картограф Е. В. Ланевич, геолог І. М. Нікітенко
технічний редактор К. М. Перелигіна

Замовлення 3/07. Тираж 100 прим. Підписано до друку 28.08.2007 р.

© ТС ЗС України, 1997 (географічна основа)
© ВАТ АЗТК ТС ЗС України, 1997 (цифрова карта)
© Державна геологічна служба Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, 2005 (геологічне наповнення)
© Північна державна регіональна геологічна підприємства "Північгеологія", 2007