У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я

С Т Р У К Т У Р Н О - Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е З О Н Ы

З А П А Д Н О - К А Л Б И Н С К А Я | К А Л Б А - Н А Р Ы М С К А Я | И Р Т Ы Ш С К А Я | Р У Д Н О - А Л Т А Й С К А Я

Эон | Эра | Период | Эпоха | Век | Геохронологическая граница (млн лет)

ФАНЕРОЗОЙСКИЙ — КАЙНОЗОЙСКАЯ — НЕОГЕНОВЫЙ — МИОЦЕН — АВИТАНСКИЙ-МЕССИНСКИЙ — 5,333
ПАЛЕОГЕНОВЫЙ — ОЛИГОЦЕН — РЮПЕЛЬСКИЙ-ХАТТСКИЙ — 23,03
ПАЛЕОЦЕН-ЭОЦЕН — ДАТСКИЙ-ПРИАБОНСКИЙ — 33,9
МЕЛОВОЙ — ПОЗДНИЙ — КАМПАН-МААСТРИХТСКИЙ — 66,0
МЕЗОЗОЙСКАЯ — ЮРСКИЙ — РАННЯЯ-СРЕДНЯЯ — ПЛИНСБАХСКИЙ-КЕЛЛОВЕЙСКИЙ — 83,6±0,2 — 163,5±1,0 — 190,8±1,0
ТРИАСОВЫЙ — СРЕДНИЙ — АНИЗИЙСКИЙ — ~ 247,2
РАННЯЯ — ОЛЕНЕКСКИЙ — 247,2 — 251,2
ПАЛЕОЗОЙСКАЯ — ПЕРМСКИЙ — ТАТАРСКАЯ — ВЯТСКИЙ — 252,17±0,06
ПРИУРАЛЬСКАЯ — АРТИНСКИЙ-КУНГУРСКИЙ — 272,3±0,5 — 290,1±0,26
КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ — СРЕДНИЙ-ПОЗДНИЙ — РАННЯЯ — СЕРПУХОВСКИЙ — 323,2±0,4
ВИЗЕЙСКИЙ — 330,9±0,2
ТУРНЕЙСКИЙ — 346,7±0,4 — 358,9±0,4
ДЕВОНСКИЙ — СРЕДНЕ-ПОЗДНЕДЕВОНСКАЯ — СРЕДНЯЯ — ЖИВЕТСКИЙ-ФРАНСКИЙ — 372,2±1,6
ЭЙФЕЛЬСКИЙ — 387,7±0,8
РАННЯЯ — ЭМССКИЙ — 393,3±1,2
ЛОХКОВСКИЙ-ПРАЖСКИЙ — 407,6±2,6
СИЛУРИЙСКИЙ — ЛЛАНДОВЕРИЙСКАЯ-ГРЕНВИЛЬСКАЯ — 419,2±3,2
ОРДОВИКСКИЙ — РАННЯЯ-ПОЗДНЯЯ — ФЛОССКИЙ-ХИРНАНТСКИЙ — 443,4±1,5
КЕМБРИЙСКИЙ — СРЕДНЯЯ-ПОЗДНЯЯ — МАЙСКИЙ-АКСАЙСКИЙ — 477,7±1,4
ПОЗДНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ

N_2pv — Павлодарская свита. Деловидные и озерные отложения. Глины бурые, красно- и коричнево-бурые, карбонатные, с мергелистыми конкрециями, кристаллами и друзами гипса, дресвой кварца, песчанистые глины, пески, гравийники (до 71 м)

N_1rb — Рубцовская свита. Озерные отложения. Глины зеленые, зеленовато- и коричнево-серые, красные и пестроцветные, гипсоносные, с олитами железа и марганца, пески, гравийники (до 89 м)

P_3-N_1kr — Крутихинская свита. Глинистые разнозернистые пески с прослоями глин и песчанистых глин серого и темно-серого цвета с растительными остатками и обломками древесины (до 64 м) (только на разрезе). Отложения свиты вмещают в разных геолого-структурных обстановках (базальные и внутриформационные палеоруса, контакты ___ проницаемых гравийно-песчаных фаций и слабопроницаемых глинисто-алевритовых) эпигенетическое урановое оруденение в связи с зонами грунтового и пластового окисления

P_3at+nm — Атлымская и новомихайлинская свиты объединенные. Кварцевые разнозернистые пески, глинистые пески с глинистыми прослойками и с примесью гравия, галек, кварца и кварцитов, каолиновые глины с растительным детритом, темно-серые алевриты с прослоями лигнита, глинисто-алевритовые и глинистые пески (до 40 м) (только на разрезе)

$P_{1-3}os+il$ — Островновская, талицкая и люлинворская свиты объединенные. Каолиновые глины. Морские прибрежно-лагунные и дельтовые отложения. Переслаивание коричнево-серых алевритов и кварцевых песков серого и светло-серого цвета, глин, тонко-мелкозернистых песков и алевритистых глин (до 100 м) (только на разрезе)

K_2gn — Ганькинская свита. Морские прибрежные отложения. Переслаивание глин, алевритистых и алевропесчанистых глин, глинистых песков с растительным детритом и фауной фораминифер, глинисто-гравийных песков, гравийников серовато-белого, серого, темно-серого, серо-коричневого, коричневого и черно-коричневого цвета (до 171 м)

$J_{1-2}lg$ — Луговская свита. Песчаники, алевролиты и аргиллиты, часто углистые, реже гравелиты, конгломераты с прослоями и пластами каменных углей, прослои бурых углей, редко сидеритов (до 550 м). Вмещают бедное сульфидное (с медью) оруденение

$J_{1-2}lg$ — Луговская свита. Песчаники, алевролиты и аргиллиты, часто углистые, реже гравелиты, конгломераты с прослоями и пластами каменных углей, прослои бурых углей, редко сидеритов (до 550 м). Вмещают бедное сульфидное (с медью) оруденение

$J_{1-2}lg$ — Луговская свита. Песчаники, алевролиты и аргиллиты, часто углистые, реже гравелиты, конгломераты с прослоями и пластами каменных углей, прослои бурых углей, редко сидеритов (до 550 м). Вмещают бедное сульфидное (с медью) оруденение

Луговской гипабиссальный комплекс долеритовый
$\gamma\beta_2J_2l$ — Дайки долеритов

Среднетриасовые риодациты и риолиты
λT_2 — Штоки и дайки риолитов, риодацитов (λ_2). С массивами комплекса ассоциируют незначительные проявления колчеданно-полиметаллических руд

Синюшинский плутонический комплекс грандиорит-гранит-лейкогранитный
$\gamma T_2\beta_2$ — Вторая фаза. Граниты биотитовые и роговообманково-биотитовые порфировидные с мегакристаллами полевого шпата
$\delta\pi T_2\beta$ — Дайки диорит-порфиров. Дайки аплитовидных гранитов
$\alpha\gamma T_2\beta$
С гранитоидами комплекса ассоциирует кварцево-жильное вольфрам-берилловое с флюоритом, молибден-кварцево-жильное оруденение, редкометальное (ниобий-танталовое) медно-сульфидно-кварцевое с серебром, золото-редкометальное оруденение. Скарны вмещают оруденение железа, вольфрама, золота

Терехтинский гипабиссальный комплекс габбро-долеритовый
$\nu\pi P_2t$ — Дайки высокотитанистых долеритов, габбродолеритов, диорит-порфиров, кварцевых диорит-порфиров

P_2k_2 — Калбинский плутонический комплекс гранитовый. Вторая фаза. Граниты гнейсовидные биотитовые и двуслюдяные лейкогранитовые. С гранитоидами комплекса ассоциирует редкометальное оруденение

γP_2k_2 — Вторая фаза. Граниты гнейсовидные биотитовые и двуслюдяные лейкогранитовые.
γP_2k_1 — Первая фаза. Граниты биотитовые крупнозернистые порфировидные, с мегакристаллами калишпата, меланограниты, редко гранодиориты
С гранитоидами комплекса ассоциирует редкометальное оруденение

Калбинский плутонический комплекс гранитовый
γP_2k_2 — Вторая фаза. Граниты гнейсовидные
γP_2k_1 — Первая фаза. Граниты биотитовые крупнозернистые порфировидные, с мегакристаллами калишпата, меланограниты, редко гранодиориты
С гранитоидами комплекса ассоциирует редкометальное оруденение

Калбинский плутонический комплекс гранитовый
γP_2k_2 — Вторая фаза. Граниты гнейсовидные биотитовые и двуслюдяные лейкогранитовые. С гранитоидами комплекса ассоциирует редкометальное оруденение

Рубцовский гипабиссальный комплекс габбро-гранит-лейкогранитовый
$t\gamma C_{2-3}r_4$ — Четвертая фаза. Лейкограниты калиевые биотитовые и двуслюдяные средне-крупнозернистые
$\gamma C_{2-3}r_3$ — Третья фаза. Граниты биотитовые, роговообманково-биотитовые, гранит-порфиры, плагиогранит-порфиры, плагиограниты
$q\delta C_{2-3}r_2$ — Вторая фаза. Кварцевые диориты, тоналиты
$\nu C_{2-3}r_1$ — Первая фаза. Габбро, габбронориты, габбродиориты, диориты.
С гранитоидами комплекса ассоциирует золото-редкометальное, прожилковое и прожилково-вкрапленное золото-серебросодержащее медно-сульфидно-кварцевое, кварцево-жильное серебряно-полиметаллическое, бедное золото-шеелитовое оруденение и зоны окварцевания с гематитом

Панфиловский вулканический комплекс андезит-дацит-риолитовый
$C_{2-3}pn$ — Панфиловская толща. Туфы, туффиты и лавы риолитов, дацитов, редко андезибазальтов, туфопесчаников, туфогравелиты, песчаники и алевролиты вулканомиктовые (менее 900 м)
$\alpha\gamma C_{2-3}pn$ — Субвулканические образования. Андезиты, дацит-андезиты, андезибазальты. Риолиты, риодациты, дациты. Дайки андезитов. Дайки риолитов, дацитов
$\beta\delta C_{2-3}pn$
$\alpha C_{2-3}pn$
$\lambda C_{2-3}pn$
Образования комплекса вмещают бедное колчеданно-полиметаллическое и медно-колчеданное оруденение

$C_{1-2}tb-C_{2-3}bk$ — Таубинская свита и бакырчикская толща нерасчлененные. Алевролиты, аргиллиты углеродисто-глинистые (более 2000 м). Углеродсодержащие толщи таубинской свиты благоприятны для локализации золото-сульфидного оруденения

$C_{1-2}ag$ — Аганактинская свита. Алевролиты, реже аргиллиты сильно углеродистые, прослои песчаников, сланцы черные углеродисто-хлоритовые (4000 м). Углеродсодержащие толщи аганактинской свиты благоприятны для локализации золото-сульфидного оруденения

$C_{1-2}mu$ — Малоульбинская свита. Алевролиты и аргиллиты серые, нередко углистые, песчаники полимиктовые, прослои гравелитов и конгломератов, прослои и пласты каменных углей, редко известняки (1650 м)

Волчихинский гипабиссальный комплекс габбро-тоналит-гранитовый
γC_3v_3 — Третья фаза. Граниты биотитовые, часто гнейсовидные, гранитогнейсы мусковит-биотитовые
$\gamma\delta C_3v_2$ — Вторая фаза. Гранодиориты, тоналиты, плагиогранитоиды, нередко гнейсовидные, плагиогранитогнейсы
νC_3v_1 — Первая фаза. Габбро, габбронориты, габбродиориты
С гранитоидами комплекса ассоциирует золото-редкометальное, прожилковое и прожилково-вкрапленное золото-серебросодержащее медно-сульфидно-кварцевое, кварцево-жильное серебряно-полиметаллическое, бедное золото-шеелитовое оруденение и зоны окварцевания с гематитом

Волчихинский гипабиссальный комплекс габбро-тоналит-гранитовый
γC_3v_3 — Третья фаза. Граниты биотитовые, часто гнейсовидные, гранитогнейсы мусковит-биотитовые
$\gamma\delta C_3v_2$ — Вторая фаза. Кварцевые диориты, диориты, диоритогнейсы. Гранодиориты, тоналиты, нередко гнейсовидные, плагиогранитогнейсы, плагиограниты
νC_3v_1 — Первая фаза. Габбро, габбронориты, габбродиориты
С гранитоидами комплекса ассоциирует золото-редкометальное, прожилковое и прожилково-вкрапленное золото-серебросодержащее медно-сульфидно-кварцевое, кварцево-жильное серебряно-полиметаллическое, бедное золото-шеелитовое оруденение и зоны окварцевания с гематитом

Белоцерюшинский гипабиссальный комплекс габбро-тоналит-гранитовый
$t\gamma C_3v_4$ — Четвертая фаза. Лейкограниты калиевые биотитовые и двуслюдяные, средне-крупнозернистые
γC_3v_3 — Третья фаза. Граниты биотитовые, часто гнейсовидные, гранитогнейсы мусковит-биотитовые
$q\delta C_3v_2$ — Вторая фаза. Кварцевые диориты, диориты, диоритогнейсы. Гранодиориты, тоналиты, нередко гнейсовидные, плагиогранитогнейсы, плагиограниты (γ_2)
νC_3v_1 — Первая фаза. Габбро, габбронориты, габбродиориты
С гранитоидами комплекса ассоциирует золото-редкометальное, прожилковое и прожилково-вкрапленное золото-серебро-содержащее медно-сульфидно-кварцевое, кварцево-жильное серебряно-полиметаллическое, бедное золото-шеелитовое оруденение и зоны окварцевания с гематитом
$\alpha\beta\gamma C_3v$
$\gamma\pi C_3v$

C_3at — Артолыкская свита. Серощветные песчаники с прослоями алевролитов и конгломератов (2400 м)

D_3-C_1tk — Танырская серия (аблакетинская и баттакская свиты). Алевролиты глинистые, углисто-глинистые с прослоями песчаников; сланцы глинистые, углеродисто-глинистые, углеродисто-кварцево-слюдистые, филлитовидные (более 1900 м). Углеродсодержащие образования серии благоприятны для локализации золото-сульфидного оруденения

Бухтарминская свита. Известняки, алевролиты известковистые и глинистые, реже углистые, аргиллиты, редко прослои песчаников (730–840 м). Образования свиты вмещают зоны окварцевания с бедным оруденением меди, серебра, бедное оруденение урана

Белорецко-маркаколький гипабиссальный комплекс габбро-долеритовый
$\beta D_3\beta m$ — Долериты, габбродолериты. С габбродолеритами ассоциирует золото-кварцевое и бедное золото-мышьяковисто-сульфидное оруденение
$\beta D_3\beta m$ — Дайки долеритов, габбродолеритов, диорит-порфиритов. Силлы долеритов
$\beta D_3\beta m$

Пихтовский вулканический комплекс базальт-дацит-риолитовый
$D_3\beta n-tr$ — Снегиревская, пихтовская и тарханская свиты объединенные. Алевролиты, песчаники, туфопесчаники, туфоалевролиты, туфогравелиты, туфоконгломераты, андезиты, андезибазальты, базальты, прослои туфов, туффитов и лавобрекчий среднего и кислого состава, кластолавы риолитов, редко углистые алевролиты, гравелиты и конгломераты, линзы песчанистых известняков (до 2180 м)
$\alpha\beta D_3ph$ — Субвулканические образования. Базальты, андезибазальты. Андезиты. Риолиты, дациты. Дайки базальтов, дацитов, гранит-порфиров. С массивами комплекса ассоциируют незначительные проявления колчеданно-полиметаллических руд
$\gamma\pi D_3ph$
βD_3ph
λD_3ph

Устьянский гипабиссальный комплекс гранит-лейкогранитовый
γD_3u — Граниты и лейкограниты биотитовы. С гранитоидами комплекса ассоциирует бериллий-литиевое оруденение
$\gamma\pi D_3u$ — Дайки гранит-порфиров

Международный плутонический комплекс габбро-диорит-гранодиоритовый
$\gamma\delta D_3m_2$ — Вторая фаза. Гранодиориты роговообманковые, меланограниты биотит-роговообманковые низкощелочные повышенно известковистые

D_3al — Алейская свита. В верхней части – алевролиты, аргиллиты, песчаники, туфопесчаники, туффиты; в нижней части – туфолитмичное переслаивание конгломератов, гравелитов, песчаников, туфопесчаников, алевролитов, аргиллитов (340–1700 м)

Змеиногорский гипабиссальный комплекс габбро-гранит-лейкогранитовый
$t\gamma D_3z_4$ — Четвертая фаза. Лейкограниты биотитовые, часто микропегматит-порфировые, лейкогранит-порфиры, аляскиты
γD_3z_3 — Третья фаза. Граниты биотит-амфиболовые катаклазированные олнейсованные, лейкоплагиограниты биотитовые, роговообманково-биотитовые
$\gamma\delta D_3z_2$ — Вторая фаза. Гранодиориты, тоналиты, гранодиорит-порфиры, меланограниты, меланоплагиограниты, кварцевые диориты, плагиограниты биотит-роговообманковые (γ_2)
νD_3z_1 — Первая фаза. Габбро, габброамфиболиты, габбродиориты, диориты амфиболизированные
С гранитами третьей и четвертой фазы ассоциируют зоны окварцевания и скарнирования с бедным шеелитовым оруденением. Зоны окварцевания с медью, свинцом, цинком, серебром и золотом. Габбро первой фазы вмещают бедное магнетитовое оруденение
βD_3z
$\gamma\pi D_3z$
Дайки долеритов, диорит-порфиров. Дайки гранит-порфиров, лейкогранит-порфиров, гранодиорит-порфиров, плагиогранит-порфиров, аплитовидных гранитов. Дайки гранит-порфиров вмещают золото-кварцево-сульфидное оруденение. С дайками ассоциируют скарны с непромышленным магнетитовым оруденением

$D_{3-u}\check{s}p$ — Шипуновская свита. Аргиллиты, алевролиты, реже песчаники, прослои туффитов кислого и смешанного составов, туфоидов, линзы осадочных брекчий и силицитов; в низах на отдельных участках потоки базальтов и андезитов (до 1360 м). Благоприятная среда для локализации золото-сульфидного и бедного золото-мышьяковисто-сульфидного оруденения

Каменевский вулканический комплекс базальт-дацит-риолитовый
$D_{3-u}kmn$ — Каменевская свита. Алевролиты, аргиллиты, песчаники, туфопесчаники, туфогравелиты, риолиты, риодациты, андезиты, андезибазальты, их туфы и лавобрекчии, реже лавы, туффиты, прослои осадочных брекчий и конгломератов, линзы известняков (до 2100 м). Породы свиты вмещают залежи колчеданно-полиметаллических (с золотом и серебром) и медно-колчеданных руд, бедное карбонатное оруденение марганца, оруденение молибдена, серебра, урана
$\alpha\gamma D_{3-u}kmn$ — Субвулканические образования. Базальты, андезибазальты, андезиты. Риолиты, дациты, риодациты. Дайки базальтов. Дайки риолитов, дацитов. С массивами комплекса ассоциируют залежи колчеданно-полиметаллических и медно-колчеданных руд, оруденение серебра, зоны разрывных нарушений вмещают бедное вольфрамовое, молибденовое и урановое оруденение
$\beta D_{3-u}kmn$
$\lambda D_{3-u}kmn$

D_3ks — Кыстав-курчумская свита. Метаалевролиты, сланцы известковисто-глинистые, углисто-глинистые, метапесчаники (более 700 м). Углеродсодержащие образования свиты благоприятны для локализации золото-сульфидного оруденения

Алейский плутонический комплекс габбро-тоналит-плагиогранитовый
$p\gamma D_3\alpha_2$ — Вторая фаза. Плагиограниты, плагиолейкограниты и грандиориты биотитовые, биотит-роговообманковые грубо-крупнозернистые порфировидные, часто катаклазированные
$\nu D_3\alpha_1$ — Первая фаза. Габбро, габбронориты, габбропироксениты, габбродиориты

Мельничнo-сосновский вулканический комплекс дацит-риолитовый
$D_{1-2}ms$ — Мельничная, сосновская, заводская свиты объединенные. Алевролиты, аргиллиты известковистые, часто окремненные, песчаники, туфопесчаники, туфоалевролиты, прослои и линзы известняков, в средней части – риолиты, риодациты, кластолавы, лавобрекчии, игнимбриты, туфы, туффиты и туфопороды кислого состава, редко основного состава, в низах – граувакки и конгломераты (до 1720 м). Породы комплекса вмещают полиметаллическое и колчеданно-полиметаллическое, медно-колчеданное, золото-серебро-барит-полиметаллическое, медно-сульфидно-кварцевое с золотом и серебром, серебряно-сульфидно-кварцевое, золото-кварцевое оруденение, жилы барита. В пределах оруденевших участков содержат месторождения яшм
$\alpha\beta D_{1-2}ms$ — Субвулканические образования. Риолиты, риодациты, дациты, андезиты нерасчленные. Дайки риолитов, риодацитов. Ассоциирует золото-серебро-барит-полиметаллическое, колчеданно-полиметаллическое, медно-сульфидно-кварцевое с золотом и серебром оруденение, отмечаются бедное вольфрамовое оруденение и зоны окварцевания с молибденовым оруденением
$\lambda D_{1-2}ms$

Иртышский комплекс метаморфический
sD_1iD_2 — Сланцы кварц-серицит-хлоритовые, кварц-серицитовые, эпидот-карбонат-альбитовые, графитисто-кварц-биотитовые, амфиболовые. Кристаллосланцы слюдистые, гнейсы. Амфиболиты, кристаллосланцы амфиболовые. Породы комплекса вмещают сульфидное (с медью, свинцом, цинком и серебром) оруденение в экзоконтакте гранитоидов приритышского комплекса
ksD_1iD_2
αD_1iD_2

Сарбасский плутонический комплекс дунит-гарцбургитовый
$ud\Gamma D_1s$ — Нерасчленненные перидотиты, гарцбургиты, дуниты, перидотиты серпентинизированные, карбонатизированные, горнблендиты амфиболизированные. Вмещают бедное хромитовое оруденение

$S-D_1kr$ — Корбалихинская толща. В верхней части – метапесчаники и метаалевролиты с прослоями сланцев, редко метаконгломератов и гравелитов. В нижней части – метаморфические сланцы кварц-эпидот-хлоритовые, глинисто-хлоритовые, углеродисто-глинистые, существенно серицитовые; филлиты с прослоями метапесчаников, редко кварцитопесчаников, мраморов (5000 м). Вмещают золото-кварцевое, бедное сульфидное оруденение с медью, свинцом, цинком и кобальтом. Породы толщи являются благоприятной средой для образования золотого и золото-редкометального оруденения. Скарны вмещают непромышленное магнетитовое оруденение. В зонах рассланцевания развиты прожилки барита

Картографическая фабрика ВСЕГЕИ
199178, Санкт-Петербург, Средний пр., 72. Тел. 321-8121, факс 321-8153

Оформлено и отпечатано на Картографической фабрике ВСЕГЕИ
Заказ 81114012. Тираж 150 экз. Подписано к печати 21.12.2015