МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ масштаба 1 : 1 000 000

Третье поколение

НОРИЛЬСКАЯ СЕРИЯ

КАРТА ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРОГНОЗА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

R-45 (Норильск)



Карта составлена в ФГУП "ВСЕГЕИ"
Авторы: П.Г. ПАДЕРИН, А.Ф. ДЕМЕНЮК
Редактор В.А. РАДЬКО
Сведения о полезных ископаемых даны на карте по состоянию на 01 января 2015 г.
Карта рекомендована к изданию НРС Роснедра 6 ноября 2015 г.
Эксперт НРС Г.В. Шнейдер

Цифровая модель подготовлена в ФГУП "ВСЕГЕИ"
Составитель Н.В. Петушкова

км 10 0 10 20 30 40 50 км
в 1 сантиметре 10 километров

Карта оформлена и отпечатана на Картографической фабрике ВСЕГЕИ
Редакторы подготовки к изданию: картограф Г.Ф. Иванова, геолог Н.П. Пежемская
Технический редактор С.А. Радченко
Заказ 81114030. Тираж 150 экз. Подписана к печати 17.06.2016

© Роснедра, 2016
© ФГУП "ВСЕГЕИ", 2015
© П.Г. Падерин, А.Ф. Деменюк, 2015
© Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2016

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УЧАСТКИ НЕДР, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ ФГУП "ВСЕГЕИ" И ООО "НОРИЛЬСКГЕОЛОГИЯ" С АВТОРСКИМИ ПРОГНОЗНЫМИ РЕСУРСАМИ

Масштаб 1 : 2 000 000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Прогнозные ресурсы меди и никеля, млн т:

17
Cu
Ni



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Прогнозные ресурсы платины и платиноидов, т:

0–53
54–168
168–376
377–3426

Авторские данные подсчетов прогнозных ресурсов по перспективным участкам

№	Категория ресурсов	Медь, млн т	Никель, млн т	Платина, т	Организация
1	P_3	1,9	0,95	139	ВСЕГЕИ, 2014
2	P_3	3,77	1,89	275	ВСЕГЕИ, 2014
3	P_3	1,06	0,53	78	ВСЕГЕИ, 2014
4	P_3	1,7	0,86	126	ВСЕГЕИ, 2014
5	P_3	1,32	0,66	97	ВСЕГЕИ, 2014
6	P_3	1,9	0,95	139	ВСЕГЕИ, 2014
7	P_3	1,52	0,76	111	ВСЕГЕИ, 2014
8	P_3	5,14	2,58	376	ВСЕГЕИ, 2014
9	P_3	1,98	0,99	145	ВСЕГЕИ, 2014
10	P_3	14,88	7,46	1088	ВСЕГЕИ, 2014
11	P_3	1,05	0,53	77	ВСЕГЕИ, 2014
12	P_3	2,39	1,62		Норильскгеология
13	P_3	0,8	0,53	128	Норильскгеология
14	P_3	2,88	1,44	210	ВСЕГЕИ, 2014
15	P_3	1,8	0,91	132	ВСЕГЕИ, 2014
16	P_3	1,17	0,59	86	ВСЕГЕИ, 2014
17	P_3	0,72	0,36	53	ВСЕГЕИ, 2014
18	P_3	1,73	0,87	127	ВСЕГЕИ, 2014
19	P_3	1,51	0,75	110	ВСЕГЕИ, 2014
20	P_3	5,2	2,9		Норильскгеология
21	P_3	0,98	0,49	72	ВСЕГЕИ, 2014
22	P_3	1,46	0,73	107	ВСЕГЕИ, 2014
23	P_3	0,51	0,25	37	ВСЕГЕИ, 2014
24	P_3	2,98	1,49	217	ВСЕГЕИ, 2014
25	P_3	0,6	0,3	44	ВСЕГЕИ, 2014
26	P_3	0,6	0,3	44	ВСЕГЕИ, 2014
27	P_3	2,99	1,5	219	ВСЕГЕИ, 2014
28	P_3	1,53	0,77	112	ВСЕГЕИ, 2014
29	P_1	4,5	2,5	1816	Норильскгеология
30	P_2	3,927	2,277	1474	Норильскгеология
31	P_2	31,38	16,9		Норильскгеология
32	P_2	8,5	4,75	3426	Норильскгеология
33	P_2	10,76	5,8		Норильскгеология
34	P_3	1,85	0,93	136	ВСЕГЕИ, 2014
35	P_3	1,79	0,9	131	ВСЕГЕИ, 2014
36	P_3	0,67	0,33	49	ВСЕГЕИ, 2014
37	P_3	1,81	0,91	132	ВСЕГЕИ, 2014
38	P_3	2,7	1,35	198	ВСЕГЕИ, 2014
39	P_3	2,29	1,15	168	ВСЕГЕИ, 2014
40	P_3	13	7		Норильскгеология
41	P_3	1,48	0,74	108	ВСЕГЕИ
42	P_2	3,525	2,475		Норильскгеология
43	P_3	1,31	0,66	96	ВСЕГЕИ, 2014
44	P_3	3,05	1,53	223	ВСЕГЕИ, 2014
45	P_3	0,71	0,35	52	ВСЕГЕИ, 2014
46	P_3	1,07	0,54	79	ВСЕГЕИ, 2014
47	P_3	0,16	0,112	204	Норильскгеология
48	P_2	1,65	1,2	1790	Норильскгеология
49	P_3	2	1,4	1720	Норильскгеология
50	P_2	5,4	2,7	1350	Норильскгеология

СХЕМА МИНЕРАГЕНИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ РУДНЫХ РАЙОНОВ И УЗЛОВ

Масштаб 1 : 2 500 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Продуктивность	Производственная инфраструктура: Благоприятная (Б)	Удовлетворительная (У)	Малоблагоприятная (М)
Высокая (В)	ВБ		
Средняя (С)	СБ	СУ	СМ
Низкая (Н)			НМ

Продуктивность

Высокая – установлено (или прогнозируется) крупное месторождение профилирующего для узла комплекса полезных ископаемых

Средняя – установлено (или прогнозируется) среднее месторождение профилирующего для узла комплекса полезных ископаемых

Производственная инфраструктура

Благоприятная – вблизи действующих горнодобывающих предприятий в зоне влияния энергосистем, железных и автомобильных дорог

Удовлетворительная – зоны влияния энергосистем, железных и автомобильных дорог

Малоблагоприятная – вне зон влияния энергосистем, железных и автомобильных дорог

$\frac{P_3}{N=0,18}$ Категории и величины прогнозных ресурсов минерального сырья в млн тонн

МИНЕРАГЕНИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(а – установленные, б – прогнозируемые)

а 8.1 Ni,Pt,Cu
б 7.3 Ni,Pt,Cu
Рудные районы

а 7.2.2 Ni,Pt,Cu
б 7.3.1 Ni,Pt,Cu
Рудные узлы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЭОНОТЕМА	ЭРАТЕМА	СИСТЕМА	ОТДЕЛ
ФАНЕРОЗОЙСКАЯ	КАЙНОЗОЙСКАЯ	ПАЛЕОГЕНОВАЯ	ЭОЦЕН-ОЛИГОЦЕН
			ПАЛЕОЦЕН
	МЕЗОЗОЙСКАЯ	МЕЛОВАЯ	ВЕРХНИЙ
			НИЖНИЙ
		ЮРСКАЯ	ВЕРХНИЙ
			СРЕДНИЙ
			НИЖНИЙ
	ПАЛЕОЗОЙСКАЯ	ТРИАСОВАЯ	ВЕРХНИЙ
			СРЕДНИЙ
			НИЖНИЙ
		ПЕРМСКАЯ	ТАТАРСКИЙ
			КАЗАНСКИЙ–ШАРМАРИЙСКИЙ
		КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	ВЕРХНИЙ
			СРЕДНИЙ
			НИЖНИЙ
		ДЕВОНСКАЯ	ВЕРХНИЙ
			СРЕДНИЙ
			НИЖНИЙ
		СИЛУРИЙСКАЯ	ВЕРХНИЙ
			НИЖНИЙ
		ОРДОВИКСКАЯ	ВЕРХНИЙ
			СРЕДНИЙ
			НИЖНИЙ
		КЕМБРИЙСКАЯ	ВЕРХНИЙ
			СРЕДНИЙ
			НИЖНИЙ
ВЕРХНЕПРОТЕРОЗОЙСКАЯ	ВЕНДСКАЯ		ВЕРХНИЙ
			НИЖНИЙ
РИФЕЙСКАЯ	ВЕРХНЕРИФЕЙСКАЯ		

СЕВЕРО-СИБИРСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ

P_{2-3} Нерасчлененные отложения. Глины, пески с растительными остатками (60 м)

P_1kt Датский ярус. Котгарская свита. Пески и алевриты с подчиненными прослоями глин. В низу – прослои и линзы конгломератов с бобовинами бокситов и стяжениями сидеритизированных песчаников (100 м)

K_2tn Маастрихтский ярус. Танамская свита. Пески, алевриты, прослои глин, в основании – фосфатный горизонт (30–130 м)

K_2sl Кампанский ярус. Салладинская свита. Глины и алевриты с пластами фосфоритов и лептохлоритовых железных руд (55–190, до 300 м)

K_2ns Туронский–сантонский ярусы. Насоновская свита. Ритмичное чередование алевритов, глин, песков и песчаников. В основании ритмослоек фосфоритовые горизонты (314–480, до 600 м). Вмещает пять фосфоритовых горизонтов

K_2dr Туронский ярус. Дорожковская свита. Глины, алевролиты, пески, песчаники, фосфориты (до 300 м). Вмещает горизонт фосфоритов

$K_{1-2}dl$ Альбский–сеноманский ярусы. Долганская свита. Пески и песчаники глауконитовые с редкими прослоями алевролитов, глин и маломощными линзами бурых углей (160–372, до 600 м). Вмещает маломощные линзы бурых углей, залежи углеводородов, прослои бокситов

K_1jak Аптский–альбский ярусы. Яковлевская свита. Чередование алевритовых глин и алевролитов с прослоями песков и песчаников; многочисленные пласты бурых углей (210–270, до 580 м). Вмещает многочисленные пропластки бурых углей, залежи углеводородов

K_1mh Готеривский–аптский ярусы. Малохетская свита. Песчаники каолинизированные, подчиненные прослои алевролитов и глин, прослои и линзы бурых углей (195–290, до 550 м). Вмещает линзы бурых углей, залежи углеводородов

K_1sd Готеривский–барремский ярусы. Суходудинская свита. Глины, алевриты, песчаники, пески (62–146, до 700 м). Вмещает линзы бурых углей, залежи углеводородов

K_1nn Берриасский–валанжинский ярусы. Нижнехетская свита. Глины, алевриты, песчаники, пески (70–260, до 570 м). Вмещает залежи углеводородов

$J_3–K_1js$ Титонский и берриасский ярусы. Яновстанская свита. Алевролиты, алевриты, песчаники, пески, конгломераты (53–127, до 450 м)

J_3sg Юра верхняя. Титонский ярус. Сиговская свита. Алевролиты, алевриты, песчаники, пески, конгломераты (до 360 м). Вмещает залежи газа

$J_2ml+tč$ Юра средняя. Батский и келловейский ярусы. Малышевская и точинская свиты объединенные. Песчаники, алевролиты, алевриты (до 600 м). Только на разрезе

J_{1-2} Юра средняя–нижняя нерасчлененные. Песчаники, алевролиты, алевриты, глины, пачки конгломератов (до 1900 м). Только на разрезе

Ttm Триас, нерасчлененные отложения. Тампейская серия. Аргиллиты, песчаники, прослои конгломератов, гравелитов (более 260 м). Только на разрезе

НОРИЛЬСКО-ТУРУХАНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ

$T_{3-}\gamma\xi T_3b$ Болготохтохский комплекс. Граносиениты, грандиориты, аплиты, лампрофиры. Рудогенерирует и вмещает медно-молибденовое оруденение

$T_{3-}\nu\beta T_{1-2}d$ / $T_{3-}\nu\beta T_{1-2}d$ Дадыканский комплекс. Пластовые тела и дайки сложного строения. Долериты, оливинсодержащие и оливиновые габбродолериты, габбро-пегматиты

$T_{3-}\nu T_{1-2}m$ / $T_{3-}\nu T_{1-2}m$ Моронговский комплекс. Дифференцированные силлы и дайки сложного строения. Габбродолериты оливиновые, троктолиты. Рудогенерирует и вмещает медно-никелевое оруденение

$T_{3-}\nu\beta T_1o$ / $T_{3-}\nu\beta T_1o$ Оганерский комплекс. Пластовые тела, дайки сложной формы. Долериты и оливиновые габбродолериты

$T_{3-}\upsilon\sigma-\nu\delta T_1n^1$ / $T_{3-}\nu T_1n^2$ / $T_{3-}\upsilon\sigma-\nu\delta T_1n^1$ / $T_{3-}\nu-\pi\delta T_1n^2$ Норильский комплекс дифференцированных интрузивов. Хонолиты, ленточвидные пластовые тела. Норильско-талнахский тип: перидотиты, габбродолериты, троктолиты, такситовые габбродолериты, лейкогаббро. Зубовский тип ($\upsilon\sigma-\nu\delta T_1n^1$) – перидотиты, троктолиты, кварцсодержащие долериты, габбродиориты; ленточвидные пластовые тела (дайки) ($\upsilon\sigma-\nu\delta T_1n^1$); круглогорский тип лейкогаббро крупнозернистые, габбродолериты оливинсодержащие; ленточвидные пластовые тела (дайки). Рудогенерирует и вмещает богатое платиноидно-медно-никелевое оруденение, дитолитовое оруденение

$T_{3-}\nu T_1k$ / $T_{3-}\nu T_1k$ Курейский комплекс. Силлы и тела сложной морфологии. Габбродолериты, троктолиты, кварцсодержащие габбродолериты. Рудогенерирует и вмещает вкрапленное медно-никелевое оруденение

$T_{3-}\upsilon\sigma-\nu\delta T_1nf$ / $T_{3-}\upsilon\sigma-\nu\delta T_1nf$ Нижнеталнахский комплекс. Пластовые тела и хонолиты сложной морфологии. Габбродолериты оливиновые, перидотиты, троктолиты, лейкократовые габбродолериты и габбродиориты. Рудогенерирует и вмещает вкрапленное медно-никелевое оруденение

$T_{3-}\nu T_1f$ Фокинский комплекс. Пластовые тела, штоки. Оливиновые габбродолериты, троктолиты, кварцсодержащие долериты. Рудогенерирует и вмещает вкрапленное медно-никелевое оруденение

T_1tk+nd Туклонская и надеждинская свиты объединенные. Базальты пойкилоофитовые, оливинофировые порфировые, полифировые, гломеропорфировые, миндалиты, туфы, туффиты, туфопесчаники, туфоалевролиты. В верхней части – маркирующий горизонт гломеропорфировых базальтов. Растительные остатки (280–600 м)

T_1sv+hk Сыверминская, гудчихинская и хаканчанская свиты объединенные. Базальты пойкилоофитовые, толеитовые и порфировые, пикробазальты оливинофировые, гломеропорфировые, туфы, туффиты, туфопесчаники, туфоалевролиты (100–500 м)

T_1gd_2+hk Верхнегудчихинская подсвита и хаканчанская свита объединенные. Базальты пойкилоофитовые и субщелочные, толеитовые, оливинофировые, гломеропорфировые, пойкилоофитовые, пикробазальты, туфы (460 м)

T_1sv+gd_1 Сыверминская свита и нижнегудчихинская подсвита объединенные. Базальты пойкилоофитовые и субщелочные толеитовые, оливинофировые, гломеропорфировые, пойкилоофитовые, пикробазальты, туфы (до 460 м)

НОРИЛЬСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА

P_3iv Гагарьеостровский горизонт. Ивакинская свита. Субщелочные базальты, трахибазальты, туфы, туффиты, угли каменные, песчаники, алевролиты (до 170 м). Вмещает пласт каменного угля "Заметный", жеоды исландского шпата и оптического кварца, интрузии габбродолеритов с платиноидно-медно-никелевым оруденением

$\varepsilon\nu P_3\rho$ / $\varepsilon\nu P_3\rho$ Пясинский комплекс. Силлы и дайки. Долериты субщелочные титан-авгитовые, порфировидные габбро-долериты

$\varepsilon\nu P_3\theta$ / $\varepsilon\nu P_3\theta$ Ергалахский комплекс. Силлы, дайки и трубки взрыва. Трахидолериты, магматические брекчии

$P_{2-3}kr+\alpha m$ Казанский–северодвинский ярусы. Кайерканская и амбарнинская свиты объединенные. Песчаники, алевролиты, аргиллиты, конгломераты, туфопесчаники, туфоаргиллиты, пласты каменных углей. Пелециподы, растительные остатки (до 180 м). Вмещает промышленные пласты каменного угля, графита и интрузии габбродолеритов с платиноидно-медно-никелевым оруденением

P_1ob Бургуклинский горизонт. Быстринская свита. Алевролиты, песчаники, аргиллиты, конгломераты, прослои известняков, пласты каменных углей. Пелециподы, растительные остатки (170–325 м). Вмещает промышленные пласты каменных углей и интрузии габбродолеритов с платиноидно-медно-никелевым оруденением

$C_{2-3}ad$ Адыканская свита. Алевролиты, аргиллиты, песчаники, базальные конгломераты, прослои гравелитов, единичные пласты каменных углей. Растительные остатки (до 135 м). Вмещает пласты каменных углей и стратиформное медное оруденение, дитолитовую минерализацию

C_1fn+tn Турнейский и визейский ярусы. Ханельбиринская, серебрянская и тундринская свиты объединенные. Известняки, доломиты с желваками кремней, мергели, карбонатные брекчии, прослои гипсов, ангидритов. Брахиоподы, фораминиферы (до 270 м)

D_3fk Фаменский ярус. Фокинская свита. Доломиты, мергели доломитовые, аргиллиты, карбонатно-глинистые брекчии, ангидриты, каменные соли. Брахиоподы, фораминиферы, остракоды (175–645 м)

D_3nk+kl Франский ярус. Накохозская и калярогонская свиты объединенные. Аргиллиты, мергели доломитовые пестроцветные, доломиты, аргиллиты, прослои гипсов, ангидритов, каменных солей. Фораминиферы, брахиоподы, остракоды, пастероподы, пелециподы (110–740 м). Вмещает пласты каменной соли, гипса и ангидрита, проявления углеводородов

$D_{1-2}ml+ juk$ Эмский, эйфельский и живетский ярусы. Мантуровская и юктинская свиты объединенные. Мергели доломитовые, аргиллиты, алевролиты, песчаники, доломиты, пласты каменных солей, прослои известняков, гипсов, ангидритов, желваки фосфоритов, известняки органогенные и глинистые. Рыбы, брахиоподы, остракоды (110–810 м). Вмещает промышленные пласты каменной соли, гипса и ангидрита, пласты фосфоритов, капельно-жидкую нефть, газ, интрузию гранитоидов с медно-молибденовым оруденением, интрузии габбродолеритов с вкрапленным и богатым платиноидно-медно-никелевым оруденением

D_1zh+tz Лохковский–эмсский ярусы. Зубовская, курейская и разведочнинская свиты объединенные. Аргиллиты, мергели, доломиты, алевролиты, карбонатные брекчии, прослои известняков и песчаников, фосфоритов, ангидритов, гипсов, каменных солей, желваково-сгущковые конкреции. Остракоды, эвриптериды, рыбы, раковистномыны, брахиоподы (120–520 м). Вмещает пласты каменной соли, гипса и ангидрита, кахонча, прослои фосфоритов, целестин, барит, газ, интрузию гранитоидов с медно-молибденовым оруденением, интрузии габбродолеритов с вкрапленным и богатым платиноидно-медно-никелевым оруденением

$S_2–D_1mk+hr$ Пржидольский подотдел и лохковский ярус. Макусская, постничная, ямпахтинская, хребтовская свиты объединенные. Известняки, доломиты, мергели доломитовые, ангидриты, прослои карбонатных брекчий, аргиллитов, гипсов. Брахиоподы, остракоды (110–500 м)

$S_2ĉm+hk$ Лландоверийский и венлокский отделы. Чамбинская, талихитская, омнутахская и хюктинская свиты объединенные. Аргиллиты, известняки органогенные с желваками кремней, мергели, граптолитовые аргиллиты, конкреции пирита. Граптолиты, брахиоподы, трилобиты, табуляты, мшанки (190–650 м)

$O_{2-3}an+zg$ Дарривильский–катийский ярусы. Ангирская, амарканская и загорнинская свиты объединенные. Известняки органогенные, глинистые, прослои мергелей, аргиллитов, алевролитов, кварцевых песчаников, доломитов, гипсов и ангидритов, галька фосфоритов. Остракоды, брахиоподы, конодонты, трилобиты, кораллы (90–240 м)

$O_{1-2}il+gr$ Тремадокский и флоский ярусы. Ильтыкская и гургарская свиты объединенные. Известняки органогенные, доломиты глинистые, пестроцветные мергели, алевролиты, аргиллиты, известковистые песчаники, единичные прослои ангидритов, гипсов. Брахиоподы, трилобиты, гастроподы, остракоды, конодонты, граптолиты, моноплакофоры (600–1000 м)

$C_3čp+ug$ Саксий–батырбайский ярусы. Чопкинская, туколандинская и уйгурская свиты объединенные. Известняки глинистые, мергели, доломиты известковые, линзы конгломератов. Брахиоподы, трилобиты (500-1600 м)

C_2dl Ампилий и майский ярусы. Доломитовая толща. Доломиты, известняки глинистые, фосфориты. Трилобиты, брахиоподы, гастроподы (до 200 м). Вмещает конкреции фосфоритов

C_1kp Томмотский и атдабанский ярусы. Красноморожская свита. Известняки красноцветные и серые, доломиты, мергели пестроцветные, желваки кремней. Трилобиты, брахиоподы, гастроподы, хиолиты, археоциаты (40–280 м). Вмещают желваки фосфоритов

$V_2–C_1pb$ Полбанская свита. Мергели доломитовые, известняки, доломиты, прослои кварцевых песчаников, гравелитов, конгломератов, гипсов, ангидритов. Акритархи, микрофитолиты, брахиоподы, гастроподы, хиолиты (550 м)

V_1gm Гремякинская свита. Доломиты глинистые, мергели доломитовые. Микрофитолиты (375 м). Только на разрезе

RF_3rb Рыбнинская толща. Песчаники, алевролиты, аргиллиты, линзы гравелитов. Микрофитолиты (720 м). Только на разрезе

RF_3gb Губинская толща. Кварцевые песчаники, прослои алевролитов, аргиллитов (130 м). Только на разрезе

МИНЕРАГЕНИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ЕНИСЕЙ-ХАТАНГСКАЯ МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

0.1 УБ/K_{1-2} Малохетский буроугольный район (вне минерагенической зоны)

ПРИЕНИСЕЙСКАЯ МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

6 УК/$C_2–P_3$ Тунгусский угольный бассейн

6.1 УК/$C_2–P_3$ Норильский угольный район

7 Ni,Pt,Cu/T_1 Норильско-Хараелахская медно-платино-никелево-рудная минерагеническая